

Codeina e allattamento: rischio di intossicazione nel neonato

Nell'allattamento numerose sono le condizioni che possono richiedere un trattamento farmacologico della madre, e l'incertezza sugli effetti che la terapia può avere nel neonato può condurre alla interruzione dell'allattamento. Sono, tuttavia, noti gli innumerevoli vantaggi, sia dal punto di vista nutrizionale sia immunologico, dell'allattamento al seno, che dovrebbe essere interrotto soltanto se esiste la certezza che l'esposizione del bambino al farmaco attraverso il latte materno comporti un rischio.

In letteratura è stato riportato un caso di decesso di un neonato legato all'assunzione di codeina da parte della madre durante l'allattamento.

Nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, a partire dal 2001, non risultano segnalazioni di sospette reazioni avverse associate all'uso di codeina in allattamento, né segnalazioni riconducibili ad intossicazione da morfina nei neonati in trattamento con codeina.

La conoscenza di un eventuale rischio di intossicazione associato all'uso della codeina nelle donne che allattano può essere di estrema utilità.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO | BIF XV N.1 2008

Ettore Napoleone

**Responsabile Nazionale FIMP Ricerca e Sperimentazione sui Farmaci
Membro Gruppo Multidisciplinare AIFA " Farmaci e Bambini**